

INJECTION D'INSULINE AU MOYEN D'UN STYLO

PROFESSIONS CONCERNES ASSC et infirmiers ES

DEFINITION Introduction d'insuline dans les tissus sous-cutanés au moyen d'un stylo : dispositif d'injections multiples, jetable, prérempli avec de l'insuline.

BUT Compenser le déficit d'insuline, permet l'auto-injection facilement.

TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	2
BIBLIOGRAPHIE	4

Cette fiche de soins est le fruit du travail du corps enseignant du ceff SANTÉ-SOCIAL. Elle est à votre disposition pour vous aider dans votre formation, respectivement dans l'accomplissement de votre activité professionnelle, à titre de recommandation standard et sans contrainte sur les protocoles de soins des institutions. Elle n'engage donc en rien la responsabilité juridique du ceff SANTÉ-SOCIAL, ni celle des membres de son personnel, l'entière responsabilité de l'acte de soins restant le fait de son auteur.


Etat: version Février 2024


MATERIEL

- Solution hydroalcoolique pour les mains
- Gants non stériles à usage unique
- Plateau
- Stylo à insuline personnel
- ▶ Aiguille d'injection adaptable au stylo
- Tampons secs non stériles
- Désinfectant alcoolique
- Antiseptique alcoolique
- Container à piquants tranchants
- ▶ Pince à clamper ou dispositif de retrait de l'aiguille
- Petit pansement / sparadrap
- Poubelle

REALISATION DU SOIN









Désinfection des mains


- Déposer sur le plateau désinfecté le matériel nécessaire à l'injection
- Agiter le stylo pour homogénéiser l'insuline
- Désinfecter la membrane en caoutchouc à l'aide d'un tampon sec imbibé de désinfectant alcoolique
- Visser l'aiguille sur le stylo
- ▶ Presser sur le piston sans sélectionner d'unités afin de purger l'aiguille et d'assurer le bon fonctionnement du stylo. Si aucune goutte n'apparait au bout de l'aiguille → sélectionner 2 UI et purger. SI toujours aucune goutte, changer l'aiguille et répéter l'opération. Si toujours aucune goutte, changer de stylo.
- ▶ En cas de nouveau stylo, toujours purger 1-2Ul.
- Sélectionner le nombre d'unités à injecter selon OM en tournant le sélecteur de dose
- Installer le patient, repérer le site d'injection (selon schéma)



Désinfection des mains



Mettre les gants




- ▶ Faire un pli cutané uniquement si la taille de l'aiguille est de 8mm ou que l'injection se fait dans un membre d'un patient mince (hors abdomen).
- Pour les autres cas, pas besoin de faire le pli. Pour les aiguilles sécurisées, il est recommandé de tendre la peau afin d'être sûr que l'aiguille est bien dans le tissu sous-cutané.
- ▶ Piquer d'un geste sûr, sans rebonds à 90° sans appuyer sur le piston.
- Appuyer au maximum sur le piston puis attendre 10sec après l'injection avant de retirer l'aiguille
- ▶ Retirer l'aiguille et comprimer avec un tampon sec
- Retirer l'aguille avec la pince à clamper ou dispositif de retrait de l'aiguille
- Jeter l'aiguille même protégée dans le container à piquants-tranchants
- Proposer un petit pansement ou sparadrap



Enlever les gants



Désinfection des mains



BIBLIOGRAPHIE

- ► HUG, injection d'insuline au moyen d'un stylo, 2013. https://www.hug.ch/procedures-de-soins/injection-dinsuline-au-moyen-de-stylo
- ► GUTS, Injection d'insuline, 2022. https://guts.hevs.ch/Documents-GUTS/linjection-sous-cutan201e-ou-hypodermique-sc
- ► Careum, Ed. 2017, compétence D6

Images:

► HUG, injection d'insuline au moyen d'un stylo, 2013. https://www.hug.ch/procedures-de-soins/injection-dinsuline-au-moyen-de-stylo

Votre commentaire sur le formulaire